

นียมการประมวลผลรายงาน

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อรายงาน | รายงานอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ |
| วัตถุประสงค์ของรายงาน | เพื่อประเมินการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง |
| การกำหนดเงื่อนไข | <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมารับบริการ => กำหนดช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ - อายุของผู้ป่วย => กำหนดอายุของผู้ป่วยที่ต้องการประมวลผล - สิทธิการรักษาพยาบาล => กำหนดกลุ่มสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ต้องการประมวลผล - สถานะการอยู่อาศัยในพื้นที่ => กำหนดสถานะการอยู่อาศัยของผู้ป่วยที่ต้องการประมวลผล - เงื่อนไขการประมวลผล => กำหนดเงื่อนไขการประมวลผลการประมวลเพื่อจำแนกรายงาน <ul style="list-style-type: none"> ● ตามรายพื้นที่ => ประเมินความครอบคลุมจำแนกตามรายพื้นที่ อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ● ตามเขตรับผิดชอบของสถานบริการ => ประเมินความครอบคลุมจำแนกตามเขตรับผิดชอบของสถานบริการ เป็นราย CUP/หน่วยบริการ ● ตามสถานบริการที่ให้บริการ => ประเมินภาระงานจำแนกตามจำนวนการให้บริการของหน่วยบริการ เป็นราย CUP/หน่วยบริการ |
| ผลลัพธ์ของรายงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ได้รับการรักษาในรอบระยะเวลาที่กำหนด (คน) คือ จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่มารับบริการในช่วงเวลาที่กำหนด - จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ (คน) คือ จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่กำหนด <p><u>ร้อยละ</u> คำนวณจาก</p> $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่ได้รับคำแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่} \times 100}{\text{จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ที่ได้รับการรักษาในรอบระยะเวลาที่กำหนด}}$ |